

# 「使用上の注意」改訂のお知らせ

## テトラサイクリン製剤

(一般名：テトラサイクリン塩酸塩)

### 1) アクロマイシンVカプセル50mg

### アクロマイシンVカプセル250mg

### 2) アクロマイシン末

製造販売元：株式会社ポーラファルマ

謹啓 時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、標記のテトラサイクリン製剤につきまして「使用上の注意」を改訂いたしましたので、御案内申し上げます。

なお、改訂後の「使用上の注意」全文につきましては、改訂添付文書を御参照ください。

今後とも、御愛顧、御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

#### 【改訂内容】

アトバコン製剤との相互作用について、2. 相互作用「併用注意」に追記いたしました。

#### 【改訂理由】

アトバコン製剤（商品名：『マラロン配合錠』及び『サムチレール内用懸濁液15%』、製造販売元：グラクソ・スミスクライン株式会社）の添付文書中に、テトラサイクリンとの相互作用について記載されたため自主改訂いたしました。

アトバコンの臨床試験において、テトラサイクリンと併用した際、機序は不明ですがアトバコンの血漿中濃度が約40%低下したとの報告がされています。

なお、現在のところ併用によるテトラサイクリンの効果への影響及び副作用の報告はありません。

この「使用上の注意改訂」の内容は、DSUNo.219（5月発行）に掲載予定です。

最新の医薬品添付文書改訂情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」

(<http://www.info.pmda.go.jp/>) をご確認ください。

■改訂内容（ \_\_\_\_\_ : 追記部分）

## 1) アクロマイシンVカプセル50mg、アクトマイシンVカプセル250mg

(新旧比較)

「使用上の注意」改訂後			「使用上の注意」改訂前		
<b>【使用上の注意】</b> 2. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			<b>【使用上の注意】</b> 2. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略			省略		
ボツリヌス毒素製剤	省略	省略	ボツリヌス毒素製剤	省略	省略
アトバコン	本剤との併用によりアトバコンの血漿中濃度が約 40% 低下した。	機序は不明である。	←追記		

2013-G-07

## 2) アクトマイシン末

(新旧比較)

「使用上の注意」改訂後			「使用上の注意」改訂前		
<b>【使用上の注意】(経口の場合)</b> 2. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			<b>【使用上の注意】(経口の場合)</b> 2. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略			省略		
ボツリヌス毒素製剤	省略	省略	ボツリヌス毒素製剤	省略	省略
アトバコン	本剤との併用によりアトバコンの血漿中濃度が約 40% 低下した。	機序は不明である。	←追記		

2013-G-08